

Un aliado para el cólico y estreñimiento

Nutribén® Confort AC/AE



CÓLICO

- **ÚNICA con hidrolizado** de proteínas séricas **selectivo**:
 - **β -lactoglobulina** hidrolizada.
 - **α -lactoalbúmina** intacta, proteína más digerible y mayor calidad biológica^(1,2).
- **50% lactosa**, minimiza el cólico y facilita su digestión^(3,4).

ESTREÑIMIENTO

- **33% β -palmitato** menos incidencia de estreñimiento⁽⁵⁾.
- **GOS** mejora la frecuencia de las deposiciones⁽⁶⁾.

Superados los trastornos digestivos con **Nutribén® Confort**



Fórmulas Nutribén®



Sin aceite de palma

1. In vitro Digestion of Cow's Milk Proteins by Duodenal Juice from Infants with Various Gastrointestinal Disorders. Iréne Jakobsson, Tor Lindberg, and Birgitta Benediktsson. Department of Pediatrics and Experimental Research, University of Lund, Malmö General Hospital, Malmö, Sweden. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 1: 183-191 Raven Press, New York. 2. Infant formulas with increased concentrations of alpha-lactalbumin. Eric L. Lein. Am. J. Clin Nutr 2003; 77 (suppl): 1555s-8s. 3. Improvement of symptoms in infant colic following reduction of lactose load with lactase Kanabar D, Randhawa M, Clayton P. J Hum Nutr Diet. 2001; 14: 359-63. 4. Breath hydrogen response to milk containing lactose in colicky and no colicky infants Moore DJ, Robb TA, Davidson GP. The Journal of Pediatrics, December 1988. Vol 113; number 6. 5. Zou L, Pande G, Akoh CC. Infant Formula Fat Analogs and Human Milk Fat: New Focus on Infant Developmental Needs. Annu Rev Food Sci Technol. 2016; 7:139-165. 6. Ben XM, Li J Feng ZT, et al. Low level of galacto-oligosaccharide in infant formula stimulates growth of intestinal Bifidobacteria and Word Lactobacilli. World J Gastroenterol 2008 November 14; 14(42) 6564-6568.

Con todos los nutrientes que el bebé necesita **i sin lactosa!** Nutribén® Sin Lactosa



- Para el tratamiento dietético de la intolerancia congénita o **transitoria a la lactosa**⁽⁷⁾.
- Con *Lactobacillus rhamnosus**, ayuda a reducir la duración de las diarreas⁽⁸⁾.

* Tras hervir el agua, dejarla enfriar hasta al menos 45 °C antes de preparar el biberón.

7. Recomendaciones sobre el uso de fórmulas para el tratamiento y prevención de las reacciones adversas a proteínas de la leche de vaca. Comité de nutrición de la asociación española de pediatría. Anales españoles de pediatría, Vol. 54, nº 4, 2001. 8. Tratamiento de la diarrea aguda infantil con probióticos: ensayo clínico aleatorizado de cinco preparados terapéuticos. R. Berni Canani, P. Cirillo, G. Terrin, L.Cesarano et cols. BMJ 2007; 335:340-345).

Nutribén®
Especialistas en alimentación infantil



Producto nacional



Sin aceite de palma



Innovación constante



Aviso importante: La leche materna es el mejor alimento para el lactante. Material destinado a profesional sanitario.