

# ¡PREPÁRATE PARA DESCUBRIR NOVEDADES FASCINANTES!



ESPECIALMENTE  
DESARROLLADO  
PARA  
**BEBÉS  
Y NIÑOS**



## PARA BEBÉS CON DESHIDRATACIÓN POR GASTROENTERITIS AGUDA


El **Nuevo Nestlé NANCARE HYDRATE** es una solución de **rehidratación** oral en casos de **gastroenteritis aguda que cursan con diarrea y/o vómitos y deshidratación**. Adecuado para **bebés y niños**, pero también para adultos, mitiga la pérdida de fluidos y electrolitos, proporciona al cuerpo una óptima combinación de sales, minerales y glucosa y ayuda a **mejorar el bienestar general**.

Aproximadamente **mil millones** de **episodios de diarrea** ocurrieron en niños menores de 5 años en el mundo en 2015.<sup>1</sup>

Las diarreas y los vómitos pueden causar deshidratación, que es un **problema de salud muy frecuente en lactantes y niños**<sup>2</sup> y que puede provocar consultas médicas, e incluso hospitalizaciones.

**NANCARE® HYDRATE** está indicado para el manejo dietético de la deshidratación de bebés y niños en casos de gastroenteritis, diarreas y/o vómitos.

El **Nuevo NANCARE HYDRATE** es una solución de rehidratación oral (SRO) con electrolitos, carbohidratos y una osmolaridad reducida que ayuda a evitar **las complicaciones, el número de visitas médicas y las hospitalizaciones**<sup>3,4</sup> ya que:



Reemplaza los electrolitos y el agua perdidos durante la diarrea y el vómito



Ayuda a la **rehidratación**



En línea con las **recomendaciones ESPGHAN**

**Composición del producto por sobre (4,5g) en 200ml de agua**

La dosis adecuada debe ser determinada por el pediatra, en base al nivel de deshidratación y del peso del bebé o niño

Cantidades testadas clínicamente en estudios<sup>1-4</sup>

### INFORMACIÓN NUTRICIONAL

	Por 100g	Por sobre (4,5g)
Valor energético	1205 KJ	54 KJ
Energía	288 kcal	13 kcal
Grasas	0 g	0 g
de las cuales: saturadas	0 g	0 g
Hidratos de carbono	72.0 g	3,2 g
de las cuales: azúcares	72.0 g	3,2 g
de las cuales: glucosa	71.0 g	3,2 g
Proteínas	0 g	0 g
Sal	15,2 g	0,69 g
Sodio	6090 mg	274 mg
Potasio	3382 mg	152 mg
Cloruro	9374 mg	422 mg
Citrato	9000 mg	405 mg
Osmolaridad		240 mOsm/L

1. GBD, Lancet Infect Dis. 2017;17:909-948.

2. Guarino A, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;67:586-593.

3. Guarino A, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014;59:132-52.

4. Guarino A, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2001;33 (Suppl 2): 52-12.

**NOTA IMPORTANTE:** Se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, seguida de una introducción adecuada de alimentación complementaria, y manteniéndola hasta los dos años de vida si es posible.

**Nestlé**  
**NANCARE**  
Al lado de los bebés en todo momento